

Impftermin	Impfstoff	Beginn der Immunität	Dauer der Immunität	Anmerkungen
1. Lebenstag	MSD Intervet Nobilis® Rismavac	21 Tage p.vacc.	lebenslang	<ul style="list-style-type: none"> • Marek´sche Krankheit (MD) • Stamm Rispens • attenuierter Lebendimpfstoff • 0,2 ml / Küken • s.c. Nackenhaut • i.m. Schenkelmuskulatur
1. Lebenstag	LAH Avi Pro® MD Lyo	9 Tage p.vacc.	mind. 18 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Marek´sche Krankheit (MD) • Stamm FC 126 • apathogenes Putenherpesvirus • Lebendimpfstoff • 0,2 ml / Küken • s.c. Nackenhaut • i.m. Schenkelmuskulatur
5.-9. Lebenstag	MSD Intervet Paracox® 8	14 Tage p.vacc.	mind. 36 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Kokzidiose • attenuierter Lebendimpfstoff • 0,1 ml / Küken • orale Applikation
3. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Ma5 + Clone 30	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Kombiimpfstoff gegen ND (Newcastle Disease) und IB (Infektiöse Bronchitis) • Grundimmunisierung • 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT) • Trinkwasserimpfung
4. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Gumboro D78	7 Tage p.vacc.		<ul style="list-style-type: none"> • Infektiöse Bursitis • Grundimmunisierung • evtl. Wiederholungsimpfung nach 1 Woche • 4 Wochen vor Legebeginn Boosterimpfung • Trinkwasserimpfung
5. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® ILT	Beginn der Immunisierung nach 4-5 Tagen, volle Belastbarkeit 14 Tage p.vacc.	1 Jahr nach der 2. Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • Infektiöse Kehlkopf- Luftröhren Entzündung • 1 Tropfen in 1 Auge / Tier • 1. ILT Impfung zwischen der 4. und 6. Lebenswoche • 2. ILT Impfung zwischen der 14. und 16. Lebenswoche, spätestens jedoch 4 Wochen vor Legebeginn • Augentropf Impfung
7. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Coryza	14 Tage p.vacc.	mind. 52 Wochen / nach der 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Geflügelschnupfen • 1. Impfung zwischen der 5. und 10. Lebenswoche • mind. 4 Wochen Abstand zur 2. Coryza Impfung

			Impfung	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Impfung spät. 4 - 6 Wochen vor Legebeginn • 14 Tage Abstand zu allen anderen Impfungen • 0,25 ml i.m. Injektion
9. Lebenswoche	LAH Avi Pro® ND Hitchner B1	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Newcastle Krankheit (atypische Geflügelpest) • Grundimmunisierung • Impfung ab dem 1. Lebenstag möglich • 2. Impfung im Abstand von 4 - 6 Wochen (ND Lasota) • 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT) • Trinkwasserimpfung
11. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Coryza	14 Tage p.vacc.	mind. 52 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Tage Abstand zu allen anderen Impfungen • 0,25 ml i.m. Injektion
13. Lebenswoche	LAH Avi Pro® ND Lasota	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • Newcastle Krankheit (atypische Geflügelpest) • Impfung ab dem 14. Lebenstag möglich • 14 Tage Abstand zu anderen respiratorischen Impfungen (ND, IB, ILT) • Trinkwasserimpfung • Alle 3 Monate Pflichtimpfung!
15. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® ILT	14 Tage p.vacc.	1 Jahr	<ul style="list-style-type: none"> • 2. ILT Impfung • Augentropf Impfung
17. Lebenswoche	MSD Intervet Nobilis® Gumboro D78	7 Tage p.vacc.		<ul style="list-style-type: none"> • Boosterimpfung • Trinkwasserimpfung
18. Lebenswoche	LAH Avi Pro® IB H120	21 Tage p.vacc.	mind. 6 Wochen	<ul style="list-style-type: none"> • IB 1 Impfung • Stamm Massachusetts H120 • nach 4 - 8 Wochen IB 2 Impfung H52 (Stamm Massachusetts H52) • IB 2 Impfung nur nach IB 1 Impfung möglich • Trinkwasserimpfung